

PROTOCOLE SOINS D'URGENCE (en cas d'allergie alimentaire)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

Etablissement :

ALERGIE A

COMPOSITION DE LA TROUSSE D'URGENCE

- Antihistaminique :
- Corticoïdes :
- Broncho-dilatateur :
- Adrénaline injectable : Anapen à 0.15 mg Anapen à 0.3 mg
- Autres :

Dès les premiers signes, après ingestion alimentaire alerter le SAMU (115 ou 112 sur portable) et pratiquer :

Dans tous les cas prévenir les parents

Situations	Signes d'appel	Conduite à tenir
Si crise d'asthme	- respiration difficile et/ou - Impression d'étouffer et/ou - difficultés de parler et/ou - sifflement et/ou - toux	- faire inhaler avec une chambre d'inhalation 3 bouffées : - si pas d'amélioration dans les 2 minutes faire à nouveau inhaler 3 bouffées : - si pas d'amélioration dans les 5 minutes faire avaler :
Si crise d'urticaire	- plaque rouges et démangeaisons	- faire avaler :
Si œdème de Quincke	- gonflement des lèvres - gonflement du visage et/ou - gonflement de la langue et/ou - Voix rauque et/ou - Etouffement	- faire avaler :
Si malaise	Malaise avec - démangeaisons et/ou - gêne respiratoire - douleurs abdominales et/ou nausée, vomissements	

Il de la responsabilité des parents de vérifier la date de péremption des médicaments et de les renouveler.

Date :

Signature et cachet du médecin allergologue :